

Gestion des déséquilibres digestifs

LAPINS

Agissez Maintenant...!!!

UNE PERIODE A RISQUE ACCRUE

Le printemps est synonyme de **fortes amplitudes thermiques**.

Les lapereaux y sont très sensibles et réagissent en modifiant leur comportement alimentaire.

Le risque est augmenté par de **fortes consommations avant sevrage**.

COMMENT PREVENIR ?

Dans la mesure du possible, la maîtrise des à-coups thermiques est primordiale : **contrôle régulier des ventilations** et des ambiances, isolation des capots en plein-air...

Mais le point clés est la **maitrise du rationnement** : le seul marqueur possible étant la connaissance des GMQ (maintenu sous 50g) en pesant une dizaine de cage tous les 3 à 4 jours.

SI CA DERAPE... (ON A EN PHARMACIE)

Traitement de 1^{ère} intention :

- Les colons sont bloqués (parésie) :

Chlorure de Magnésium → 2 à 5 g/litre pendant 2 à 5 jours

- Le ballonnement domine (avec ou sans mucus) :

ENTEROFIT → 1 ml/litre pendant 5 jours

- La diarrhée noir, queue en pinceau domine:

PHYTO CSC → 1 ml/litre pendant 5 jours

DANS TOUS LES CAS, prévenez immédiatement votre équipe technique et vétérinaire.

SUDELVET/ 385, Allée du Lyonnais – 26 300 BOURG DE PEAGE - Tél : 04.75.72.73.10

