

# Prévention des enterotoxémies

## limiter les surcharges

LAPINS

*Agissez Maintenant...!!!*

### POURQUOI MAINTENANT ?

Le printemps est synonyme de fortes amplitudes thermiques.  
Les animaux mangent bien, l'état d'engraissement résiduel de l'hiver peut persister.

Les femelles doivent faire face à **deux pics métaboliques majeurs** : la mise bas et le pic de lactation (en plus d'une forte productivité laitière, elles doivent construire des lapereaux)

### COMMENT AGIR ?

La priorité est de permettre au foie de beaucoup travailler sans s'engorger : donc on donne des hépatoprotecteurs.

### OBJECTIFS NUTRITIONNEL SELON L'ÉTAT DU CHEPTEL

Ajouter à la cure autour de la mise-bas (déjà préconisée), une cure de 3 jours au pic de lactation (à partir de J17, soit IA + 6 jours)

#### Utilisation

- Les femelles sont homogènes et en état, la pasteurelle ou le staphylocoque sont maîtrisés : **SEBACHOL** → 1 ml/litre pendant 3 jours
- Le cheptel est hétérogène, les mortalités femelles élevées (sup 3%), à la dernière IA les femelles étaient trop grasses ou trop maigres : **CHOLARAINOL** → 2 ml/litre pendant 3 jours



Convalescence : après un traitement antibiotique faire 5 jours de **FORCIL** à 1ml/L/j.

En cas de mauvais état ou de mortalité anormale, prévenez immédiatement votre équipe technique et vétérinaire.

